

Foglio Illustrativo: Informazioni per l'utente
Florinef 0,1 mg compresse
Fludrocortisone Acetato

Questo medicinale è stato prescritto per lei dal suo medico. Questo foglietto fornisce un riassunto delle informazioni sul farmaco. Se ha qualsiasi dubbio o vuole avere più informazioni, si rivolga al medico o al farmacista.

Ricordi che questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Solo un medico può prescriberlo. Non lo dia mai ad altri. Infatti, per altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se hanno sintomi uguali ai suoi.

COSA È FLORINEF COMPRESSE?

Florinef Compresse contiene fludrocortisone acetato che appartiene ad un gruppo di farmaci conosciuti come farmaci steroidei.

Le compresse contengono 0,1 mg di fludrocortisone acetato. Esse sono dispensate in flaconi contenenti 56 compresse. Gli altri componenti sono fosfato dicalcico, eritrosina (E127), lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, sodio benzoato (E211) e talco.

<p>Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in commercio E . R . Squibb & Sons Limited, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, England. Tel: 0800 7311736</p>	<p>Autorizzazione Irlandese alla Produzione: Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd., Swords, County Dublin, Ireland.</p>
<p>Produttore Bristol-Myers Squibb SARL Avenue Du. Dr. Gilles 28230 Epernon, France</p>	

A COSA SERVE ?

Florinef compresse è utilizzato per sostituire gli ormoni normalmente prodotti dalle ghiandole situate sui suoi reni (surrenali). Se ha il Morbo di Addison questi ormoni sono assenti. Florinef compresse è inoltre utilizzato per la terapia della sindrome adrenogenitale con perdita di sali che è una forma diversa di squilibrio ormonale.

PRIMA DI PRENDERE IL MEDICINALE

Devo prendere Florinef Compresse?

Non dovrebbe prendere Florinef se ha avuto reazioni allergiche a farmaci simili o ad uno qualsiasi dei componenti di Florinef Compresse.

Non dovrebbe prendere Florinef compresse se ha un'infezione a meno che il suo medico non le abbia prescritto una terapia per quella infezione.

Non dovrebbe prendere il farmaco per il trattamento di qualunque altra condizione oltre quella riportata.

Il suo medico dovrebbe periodicamente prescriverle analisi del sangue e regolarmente determinare il suo introito di sale per esser sicuro che non stia sviluppando ipertensione o ritenzione di fluidi o stia avendo un incremento di peso.

Vi è qualche altra cosa di cui devo discutere con il mio medico, prima di prendere Florinef?

Prima di prendere Florinef controlli con il suo medico se ha avuto recentemente un'infezione, tubercolosi, disturbi gastrici ed intestinali, ulcera, malattie trombotiche, tumori, fragilità ossea, pressione alta o scompenso cardiaco, disturbi mentali, epilessia, Miastenia gravis o glaucoma (aumento della pressione intraoculare)

Cosa accade se sono stato o sono in contatto con qualcuno affetto da varicella, Herpes zoster o morbillo?

I farmaci steroidei sopprimono la risposta immune naturale dell'organismo. Pertanto se lei viene in contatto con qualcuno che ha una malattia infettiva come varicella, herpes zoster o morbillo, consulti immediatamente il suo dottore, soprattutto se non ha precedentemente contratto la malattia. Deve porre particolare attenzione ad evitare queste malattie.

Posso esser vaccinato (immunizzato)?

Mentre è in terapia con questo farmaco (o ha sospeso da poco un trattamento) non deve esser sottoposto a vaccinazioni senza aver consultato il suo dottore.

Cosa fare se sono in gravidanza o penso di esserlo?

Cosa devo fare se sto pianificando una gravidanza?

Cosa fare se sto allattando al seno?

Informi immediatamente il suo medico, prima di iniziare a prendere Florinef compresse.

Cosa fare se ho problemi renali, epatici o tiroidei?

Ricordi al suo medico che potrebbe esser necessario aggiustare il dosaggio di Florinef.

Posso prendere altri farmaci?

I corticosteroidi possono aumentare la possibilità di sanguinamento dall'intestino dovuto ad aspirina, ibuprofene o altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Se ha ipotrombinemia (che induce tendenza al sanguinamento) e sta assumendo contemporaneamente ibuprofene o un altro FANS, il suo dottore dovrebbe prestare molta attenzione nel somministrarle Florinef compresse. Informi il medico o il farmacista se sta assumendo qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.

Alcuni farmaci utilizzati per la terapia dell'epilessia, tubercolosi o del tumore mammario possono ridurre l'efficacia di Florinef. D'altro canto Florinef può influenzare l'azione di alcuni farmaci utilizzati per trattare il diabete, l'ipertensione o fluidificare il sangue. Informi sempre il suo dottore se sta assumendo contraccettivi orali, terapia sostitutiva ormonale, ormone della crescita, farmaci per la tiroide, ciclosporina o antifungini se deve esser vaccinato o se deve esser sottoposto ad anestesia.

Si può guidare?

Queste compresse generalmente non influenzano la sua capacità di guida, ma possono influenzare la sua capacità visiva. Consulti immediatamente il suo medico se accusa dolore agli occhi o disturbi visivi.

Si possono assumere bevande alcoliche?

Non sono note interazioni tra Florinef ed alcol.

Cosa fare se sono diabetico?

Ricordi al suo medico che potrebbe esser necessario cambiare il dosaggio dell'insulina.

A chi devo dire che sto assumendo queste compresse?

Il suo dottore o il suo farmacista dovrebbe averle consegnato, assieme alla ricetta, o al farmaco una "Steroid Treatment card". DEVE SEMPRE PORTARLA CON SE e deve mostrarla a ciascuna delle seguenti persone.

- Medico o Infermiere - Prima di esser sottoposto a qualsiasi operazione chirurgica o trattamento di emergenza o se le viene prescritta qualsiasi nuova terapia.
- Dentista - Prima di avere qualsiasi tipo di chirurgia odontoiatrica.
- Farmacista - Prima di comprare qualsiasi medicinale.
- Ottico (o oculista) – è consigliabile un controllo regolare della vista.

COME PRENDERE IL MEDICINALE**Come devo prendere Florinef compresse?**

Inghiotta le compresse intere con un bicchiere di acqua.

Adulti compresi gli anziani: La dose giornaliera varia da 0,05 a 0,3 mg una volta al giorno al mattino. Una volta stabilizzata la sua condizione il suo dottore potrebbe ridurre gradualmente il dosaggio sino al livello più basso possibile che induce una scomparsa della sintomatologia. Pazienti con una terapia a lungo termine possono, in periodi di stress o malattia, richiedere l'aggiunta di altri tipi di farmaci steroidei.

Bambini. La dose dovrà esser aggiustata secondo l'altezza ed il peso ma dovrà esser sempre tenuta il più bassa possibile.

Devo prendere il medicinale prima o dopo i pasti?

È meglio che lei prenda le compresse durante o dopo il pasto.

Per quanto tempo devo prendere Florinef?

Per tutto il tempo prescritto dal suo medico

NON INTERROMPA IMPROVVISAMENTE la terapia con Florinef, poiché potrebbe esser nocivo.

Cosa devo fare se prendo troppe compresse o un bambino ne inghiotte qualcuna?

Si rechi al più vicino Pronto Soccorso o chiami immediatamente il suo dottore. Se si reca in ospedale porti con sé il flacone vuoto e ciò che rimane del farmaco.

Cosa devo fare se dimentico di prendere una dose?

Non si preoccupi, la prenda al più presto. NON PRENDA MAI una dose doppia per compensarne una dimenticata.

EFFETTI INDESIDERATI.**Quali sono tutti gli effetti indesiderati di Florinef Compresse?**

Tutti i farmaci possono causare alcuni effetti indesiderati o "collaterali". Alcuni che possono intervenire durante trattamento con steroidi sono i seguenti.

Avvisi immediatamente il suo dottore se hai allo stomaco dolori da ulcera o forti dolori addominali, gonfiore al viso o rash inaspettato. Alcuni pazienti hanno riportato aumento d'appetito, aumento di peso, indigestione, nausea, debolezza o stanchezza. Il trattamento con steroidi può causare un aumentato rischio di infezioni, assottigliamento delle ossa o dei tendini che possono causare fratture o perdita di massa muscolare, ritenzione idrica, battito cardiaco irregolare, ipertensione o tendenza alla trombosi.

Possono esserci problemi dermatologici o oculari e le ferite o le fratture ossee possono guarire lentamente. Il trattamento con steroidi può fermare la produzione di alcuni ormoni o può fermare la velocità di crescita dei bambini. Le donne possono avere irregolarità mestruali. Sono stati riportati aumenti o riduzioni del tono dell'umore, insonnia e forti mal di testa. Quando la terapia con steroidi è interrotta i pazienti hanno notato sintomi simil influenzali, rinorrea o fastidio agli occhi o alla pelle. Ricordi che non deve interrompere improvvisamente l'assunzione del farmaco.

Si rivolga al medico o al farmacista se nota qualsiasi altro fastidioso effetto collaterale.

COME CONSERVARE IL MEDICINALE

Non usi il farmaco dopo la data di scadenza che è riportata sul flacone. Lo conservi in un armadio chiuso o nell'armadietto dei medicinali AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI. Non conservi le compresse a temperatura superiore ai 25°C.

Data dell'ultima revisione Giugno 2006